

## ჯიშის აღწერილობა

კულტურა: ვაზი

ჯიშის ადგილობრივი სახელწოდება:  
რქაწითელი

ტაქსონის ბოტანიკური სახელწოდება:  
*Vitis vinifera* L. ssp.

გავრცელების არეალი: ძირითადად

გავრცელებულია კახეთში

გამოყენების სახე: იძლევა  
მაღალხარისხოვან თეთრ ღვინოს



### საპასპორტო ინფორმაცია:

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| წარმოშობის ქვეყანა                  | საქართველო, კახეთი            |
| ტაქსონომია                          | <i>Vitis vinifera</i> L. ssp. |
| სინონიმები                          | დედალი რქაწითელი, კახურა      |
| ნომერი კოლექციაში                   | GEO038 I-3                    |
| მარცვლის ფერი                       | მომწვანო-მოყვითალო            |
| გამოყენება                          | საღვინე                       |
| სავეგეტაციო პერიოდი (საშ.დღე)       | 162                           |
| ნიმუშის შესაბამისობა აღწერილობასთან | დასტურდება ამპელოგრაფიულად    |

## ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები

### ახალგაზრდა ყლორტი

|   |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 2 | ზრდის კონუსის გახსნილობა                                 | (5) სრულად გახსნილი |
| 4 | ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა | (3) სუსტი           |
| 3 | ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის სიხშირე                | (3) სუსტი           |

### ყლორტი

|    |                                       |                |
|----|---------------------------------------|----------------|
| 9  | დგომა (ახვევამდე)                     | (1) სწორმდგომი |
| 10 | მუხლთაშორისების შეფერვა ზურგის მხარეს | (3) წითელი     |
| 11 | მუხლთაშორისების შეფერვა მუცლის მხარეს | (1) მწვანე     |

### ახალგაზრდა ფოთოლი

|   |   |                            |
|---|---|----------------------------|
| 6 | ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა   | (4) სპილენძისფერი-მოწითალო |
| 7 | ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული შებუსვის სიხშირე | (5) საშუალო                |

**ზრდასრული ფოთოლი**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 18 | ფირფიტის ფორმა  | (2) სოლისებური                                      |
| 20 | ნაკვეთების რაოდენობა  | (2)(3) სამი, ხუთი                                   |
| 19 | ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება                                     | (1) არ არის ან ძალიან სუსტი                         |
| 26 | კბილების ფორმა  | (5) ორივე გვერდითი სწორი, ორივე გვერდითი ამოზნექილი |
| 23 | ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი                     | (2) ღია   |
| 28 | ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განთხმული ბუსუსების სიხშირე | (3) მცირე   |

**რქა**

|    |               |                             |
|----|---------------|-----------------------------|
| 44 | ძირითადი ფერი | (2) ნარინჯისფერი-მოყავისფრო |
|----|---------------|-----------------------------|

**რეპროდუქტიული ორგანო**

|    |         |   |
|----|---------|---|
| 16 | ყვაკილი | (3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი |
|----|---------|---|

**მტევანი**

|    |                              |             |
|----|------------------------------|-------------|
| 32 | მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე) | (5) საშუალო |
| 33 | სიკუმსე                      | (5) საშუალო |
| 34 | ყუნწის სიგრძე                | (3) მოკლე   |

**მარცვალი**

|    |                                 |                             |
|----|---------------------------------|-----------------------------|
| 36 | ფორმა (ფოტოები)                 | (4) ვიწრო ელიფსური          |
| 37 | მარცვლის კანის შეფერილობა       | (2) მომწვანო-მოყვითალო      |
| 40 | რბილობის ანტოციანური შეფერილობა | (1) არ არის ან ძალიან სუსტი |
| 41 | რბილობის სიმკვრივე              | (2) საშუალო                 |
| 42 | განსაკუთრებული გემო             | (1) არ აქვს                 |
| 43 | წიპების არსებობა                | (3) სრულფასოვანი            |

**დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:**

|           |   |                              |
|-----------|---|------------------------------|
| OIV 016   | თანმიმდევრული პკვალების რაოდენობა                                     | (1) ორი ან ნაკლები           |
| OIV 070   | ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი ძარღვების ანტოციანური შეფერილობა | (1) არ არის ან ძალიან სუსტი  |
| OIV 072   | ფოთლის ფირფიტის გოფრირება   | (1) არ არის ან ძალიან სუსტი  |
| OIV 074   | ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში                                  | (5) ტალღოვანი                |
| OIV 080   | ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა                                 | (3) V -ფორმის                |
| OIV 081-1 | ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა                           | (1) არ არის                  |
| OIV 081-2 | ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ძარღვით შემოსაზღვრულობა                     | (1) არ არის                  |
| OIV 083-2 | ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა                             | (1) არ არის                  |
| OIV 086   | ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე      | (3) სუსტი                    |
| OIV 087   | ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე     | (1) არ არის ან ძალიან სუსტი  |
| OIV 203   | მტევნის სიგანე  | (3) მცირე                    |
| OIV 208   | მტევნის ფორმა   | (1) ცილინდრული, (2) კონუსური |
| OIV 209   | ფრთების რაოდენობა   | (2) ერთი-ორი                 |
| OIV 220   | მარცვლის სიგრძე   | (5) საშუალო                  |

|         |                             |                  |
|---------|-----------------------------|------------------|
| OIV 221 | მარცვლის სიგანე             | (3) მცირე        |
| OIV 351 | ყლორტის ზრდის სიძლიერე      | (5) საშუალო      |
| OIV 502 | ერთი მტევნის წონა           | (3) მცირე        |
| OIV 503 | ერთი მარცვლის წონა          | (3) მცირე        |
| OIV 504 | მოსავალი კგ/მ <sup>2</sup>  | (7) მაღალი       |
| OIV 301 | კვირტის გაშლა               | 20-26 აპრილი     |
| OIV 303 | მარცვლის სიმწიფის დასაწყისი | 15-23 აგვისტო    |
| OIV 304 | მარცვლის სრული სიმწიფე      | 20-28 სექტემბერი |