

ჯიშის აღწერილობა

კულტურა: ვაზი

ჯიშის ადგილობრივი
სახელწოდება: საკმიელა

ტაქსონის ბოტანიკური
სახელწოდება: *Vitis vinifera* L. ssp.

გავრცელების არეალი: ძირითადად
გავრცელებულია გურიაში

გამოყენების სახე: იძლევა
მაღალხარისხოვან თეთრ ღვინოს



საპასპორტო ინფორმაცია:

წარმოშობის ქვეყანა	საქართველო, გურია
ტაქსონომია	<i>Vitis vinifera</i> L. ssp.
სინონიმები	საკმეველა
ნომერი კოლექციაში	GEO038 IV-36
მარცვლის ფერი	მომწვანო-მოყვითალო
გამოყენება	საღვინე
სავეგეტაციო პერიოდი (საშ.დღე)	175
ნიმუშის შესაბამისობა აღწერილობასთან	დასტურდება ამპელოგრაფიულად

ძირითადი ამპელოგრაფიული მახასიათებლები

ახალგაზრდა ყლორტი

2	ზრდის კონუსის გახსნილობა	(5) სრულად გახსნილი
4	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
3	ზრდის კონუსზე განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(7) ძლიერი

ყლორტი

9	დგომა (ახვევამდე)	(3) ნახევრად-სწორმდგომი
10	მუხლთაშორისების შეფერვა ზურგის მხარეს	(1) მწვანე
11	მუხლთაშორისების შეფერვა მუცლის მხარეს	(1) მწვანე

ახალგაზრდა ფოთოლი

6	ფოთლის ზედა მხარის შეფერილობა	(4) ღია სპილენძისფერი
7	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული შებუსვის სიხშირე	(7) ხშირი

ზრდასრული ფოთოლი

18	ფირფიტის ფორმა	(4) მრგვალი
20	ნაკვეთების რაოდენობა	(2) სამი
19	ფირფიტის ზედა მხარის ბურთულოვნება	(5) საშუალო
26	კბილების ფორმა	(3) ორივე გვერდი ამოზნექილი
23	ყუნწის ამონაკვეთის გახსნილობა. გადაფარვის ხარისხი	(2) ღია
28	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებს შორის განრთხმული ბუსუსების სიხშირე	(7) ძლიერი

რქა

44	ძირითადი ფერი	(1) მოყვითალო-მოყავისფრო
----	---------------	--------------------------

რეპროდუქტიული ორგანო

16	ყვაკილი	(3) სრულად განვითარებული მტვრიანები და სრულად განვითარებული გინეცეუმი
----	---------	-----------------------------------------------------------------------

მტევანი

32	მტევნის ზომა (ყუნწის გარეშე)	(5) საშუალო
33	სიკუმსე	(7) კუმსი
34	ყუნწის სიგრძე	(3) მოკლე

მარცვალი

36	ფორმა (ფოტოები)	(2) სფერული
37	მარცვლის კანის შეფერილობა	(2) მომწვანო-მოყვითალო
40	რბილობის ანტოციანური შეფერილობა	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
41	რბილობის სიმკვრივე	(1) რბილი
42	განსაკუთრებული გემო	(1) არ აქვს
43	წიპწების არსებობა	(3) სრულფასოვანი

დამატებითი მახასიათებლები OIV-ის მიხედვით:

OIV 016	თანმიმდევრული პწკალების რაოდენობა	(1) ორი ან ნაკლები
OIV 070	ფოთლის ფირფიტის ზედა მხარეზე მთავარი ძარღვების ანტოციანური შეფერილობა	(4) მეორე განტოტვამდე
OIV 072	ფოთლის ფირფიტის გოფრირება	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 074	ფოთლის ფირფიტის პროფილი განივ ჭრილში	(5) ტალღოვანი
OIV 080	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ფუძის ფორმა	(2) {- ფიგურული ფრჩხილის ფორმის
OIV 081-1	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1) არ არის
OIV 081-2	ფოთლის ყუნწის ამონაკვეთის ძარღვით შემოსაზღვრულობა	(1) არ არის
OIV 083-2	ფოთლის ზედა ამონაკვეთზე კბილების არსებობა	(1) არ არის
OIV 086	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე გართხმული ბუსუსების სიხშირე	(3) სუსტი
OIV 087	ფოთლის ქვედა მხარეს მთავარ ძარღვებზე სწორმდგომი ბუსუსების სიხშირე	(1) არ არის ან ძალიან სუსტი
OIV 203	მტევნის სიგანე	(5) საშუალო
OIV 208	მტევნის ფორმა	(2) კონუსური
OIV 209	ფრთების რაოდენობა	(2) ერთი-ორი
OIV 220	მარცვლის სიგრძე	(3) მოკლე
OIV 221	მარცვლის სიგანე	(1) ძალიან მცირე
OIV 351	ყლორტის ზრდის სიძლიერე	(5) საშუალო
OIV 502	ერთი მტევნის წონა	(3) მცირე
OIV 503	ერთი მარცვლის წონა	(3) მცირე
OIV 504	მოსავალი კგ/მ ²	(5) საშუალო
OIV 301	კვირტის გაშლა	19 აპრილი
OIV 303	მარცვლის სიმწიფის დასაწყისი	23 აგვისტო
OIV 304	მარცვლის სრული სიმწიფე	10-15 ოქტომბერი